



سلوكوكسيب
100



سلوكوكسيب
200



سلوكوكسيب
200

C'EST ETRE FLEXIBLE

OS éternels

CELECOXIB BEKER Célécoxib

CELECOXIB (Célécoxib) est un médicament appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs de la cyclooxygénase (COX-2). Il est utilisé pour soulager les douleurs, réduire l'inflammation et traiter l'arthrose, l'ostéoartrite et l'arthrite rhumatoïde. Célécoxib agit en bloquant l'enzyme COX-2, qui est responsable de la production de prostaglandines, des substances chimiques qui provoquent la douleur et l'inflammation.

Indications : Célécoxib est indiqué pour le traitement de l'arthrose, de l'ostéoartrite et de l'arthrite rhumatoïde. Il est également utilisé pour soulager les douleurs liées à ces affections.

Mode d'emploi : Célécoxib se présente sous forme de comprimés à libération prolongée. La dose recommandée est de 200 mg deux fois par jour, avec ou sans nourriture. Il est important de suivre attentivement les instructions de votre médecin et de ne pas dépasser la dose prescrite.

Effets secondaires : Les effets secondaires les plus fréquents de Célécoxib sont les maux de tête, les indigestions, les douleurs abdominales et les constipations. Des effets secondaires plus graves, tels que des problèmes rénaux, des ulcères gastriques ou des saignements, peuvent survenir, en particulier chez les personnes âgées ou celles souffrant de problèmes rénaux préexistants.

Contre-indications : Célécoxib est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère, d'ulcères peptiques, de saignements gastro-intestinaux récents ou de problèmes cardiaques graves.

Précautions : Il est important de surveiller votre santé pendant le traitement par Célécoxib, en particulier votre fonction rénale et votre système digestif. Évitez de prendre d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) sans avis médical.

Interactions médicamenteuses : Célécoxib peut interagir avec d'autres médicaments, notamment les anticoagulants, les médicaments contre le diabète et les médicaments contre l'hypertension. Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

Autres informations : Célécoxib peut affecter votre capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines. Évitez l'alcool pendant le traitement. Célécoxib est un médicament à usage médical et doit être utilisé avec précaution.

Ostonel[®] Hydroxyméthyl monostéarate

Ostonel (Hydroxyméthyl monostéarate) est un complément alimentaire à base de plantes, principalement de ginseng, utilisé pour améliorer la circulation sanguine, réduire le stress et augmenter l'énergie. Il est souvent recommandé pour les personnes souffrant de troubles circulatoires, de fatigue chronique et de problèmes de concentration.

Composition : Le complément contient des extraits de ginseng, de ginsénoïdes et d'autres ingrédients naturels. Il est généralement disponible sous forme de comprimés.

Mode d'emploi : Prenez un comprimé deux fois par jour, avec de l'eau. Il est conseillé de prendre le complément à jeun pour une meilleure absorption.

Effets secondaires : Les effets secondaires sont rares, mais peuvent inclure des maux de tête, des indigestions ou des réactions allergiques chez certaines personnes.

Contre-indications : Évitez de prendre Ostonel si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous souffrez de problèmes cardiaques graves.

Précautions : Évitez de consommer de l'alcool pendant le traitement. Informez votre médecin si vous prenez d'autres médicaments.

Autres informations : Ostonel est un produit naturel et ne remplace pas un traitement médical. Consultez votre médecin pour un avis personnalisé.

Osporix[®] Acide ascléronique

Osporix (Acide ascléronique) est un médicament antiviral utilisé pour traiter l'herpès simplex et l'herpès zoster. Il agit en bloquant la réplication du virus, empêchant ainsi sa propagation et réduisant la durée et la gravité des symptômes.

Indications : Osporix est utilisé pour le traitement de l'herpès simplex (lésions buccales et génitales) et de l'herpès zoster (zona). Il est également utilisé pour prévenir les récurrences de ces infections.

Mode d'emploi : Osporix se présente sous forme de comprimés à libération prolongée. La dose recommandée est de 500 mg deux fois par jour, avec ou sans nourriture.

Effets secondaires : Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de tête, les indigestions et les douleurs abdominales. Des effets secondaires plus graves, tels que des problèmes rénaux ou des saignements, peuvent survenir.

Contre-indications : Osporix est contre-indiqué chez les personnes souffrant d'insuffisance rénale sévère.

Précautions : Évitez de prendre Osporix si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez.

Autres informations : Osporix est un médicament à usage médical et doit être utilisé avec précaution. Évitez l'alcool pendant le traitement.